AGIP

MONTEDISON
MILANO

Distretto Minerario di RAVENNA

3E3984

Scala 1:1000

Aggiornato al

Data

Compilatore

LOG MULTIPLO

ELF80E

Pozzo MASSERIA SARACINO 1

RAPPORTO GEOLOGICO FINALE

Disegnatore M. GROSSO

Permesso PORTOCANNONE

Impianto MASSARENTI R&D

Ubicazione

Coordinate Long. 4° 59' 23"

Lat. N. 7° 37' 30"

p.c. 187 m (quota terreno mare) T.R. 3,30 m

Trattenuti m

Inizio perforazione 29 SETTEMBRE 1980

Fine perforazione 1 NOVEMBRE 1980

Inizione rilevamenti a 1 NOVEMBRE 1980

Profondità fine perforazione m 1726

Profondità finale Schlumberger m 1725,30

Esito del pozzo STERILE

Metodo produttivo

Fluido perforazione

Tubo conductor
Tubo forato con tubicini
Tubo a pareti a
Asta di perforazione a pareti a
Taglio di campione
Squeezing
Bridge Plug
Fondo distrutto
Piano di taglio rivestito
Piano distrutto intermedio
Tubing con packer di produzione
Pompa
Abbandonato
Perdita di circolazione
Cuneo di quarzo
Carota di fondo con parte litologica e petrolifera
Ingresso di fluidi

Arenaria
Conglomerato
Sabbia grossolana
Sabbia fine
Sabbia quarzosa
Sabbia calcarea
Sabbia subtrilitica
Sabbia subfeldspatica
Sabbia feldspatica
Silt
Argilla
Marna
Cemento argilloso
Cemento siltoso
Cemento carbonatico
Cemento calcitico
Cemento dolomitico
Cemento salino
Cemento ferruginoso
Cemento subcristal.
Calcari argillosi
Calcari arenacei
Marlstone
Packestone
Grainstone
Boundstone
Chalk
Calcare dolomitico
Dolomia calcarea
Dolomia argillosa
Dolomia arenacea
Dolomia fine (cristall.)
Gesso e anidrite
Sali: di Na, K, Mg
Carbone in genere
Selce
Rocce ferruginose
Rocce silicee
Rocce siltose
Rocce arenacee
Rocce conglomeratiche
Rocce metamorfiche
Pf.a Pietruzzi chalk
Pf. Pietruzzi intraglobulare
Pf. Pietruzzi oolicolari
Pf.c Pietruzzi intraclastiche
Pf. Pietruzzi per frattura
Concrezioni tuberose
Discontinuità di giunto
Frattura
Contatto tettonico

Foraminiferi planctonici
Foraminiferi bentonici
Frammenti di fossili
Radiolari in frammenti
Radiolari
Spicole di Spugna
Ostracodi
Stratificazione incrociata
Stratificazione gradata
Strutture nodulari
Stromatoliti
Bioturbazioni
Strutture sedim. deformative
Laminazione convoluta
Rapide marine
Fratture di origine organica
Pirolusite solfuretica
Strutture geopetale
Bridgestone

Pozzo CAMPOBASSO
UBICATO IN ROMA
CARTA INDICE
Carta IGM 1° 155 Tav. Scala 1: 100.000

Acqua dolce
Acqua sottosatura
Acqua salata
Tracce di gas
Gas
Tracce di olio
Olio
Bitume
Acqua salata
Acqua dolce
Gas ed acqua salata
Tracce di gas e olio in

PERFORAZIONE PROVE di STRATO FLUIDIZZAZIONI

TEMPI di AVANZAMENTO m/sec

POTENZIALE SPONTANEO millivolts

RESISTIVITA' Ohms m²/m

DESCRIZIONI LITOLOGICHE

ETA'

UNITA' STRATIGRAFICHE

ZONE BIOSTRATIGRAFICHE

PROFONDITA'

PERCENTUALE LITOLOGICA

CALCIMETRIA %

METANO

OSSERVAZIONI

PLIOCENE MEDIO

PLIOCENE SUPERIORE

PLEISTOCENE

Tutta la profondità non rilevata alla S.R.

LIMITAZIONI ELETTRICHE

CP. Registrazione
CAP-2000-AP a 250 – 700 m
AP1 = " = "
AP2 = " = "
CPA-40 m 40 a 710 m

CP. Registrazione
CAP-2000-AP a 702 – 1027 m
AP1 = 1180 – 1567 m
AP2 = 702 – 1726 m

DATI DI PERFORAZIONE

Da a 0 a 5,6 m perforazione con fango di foro bentonitico.

DENSITA'

	kg/l
0 – 30	1,04
30 – 91	1,10 – 1,11
91 – 168	1,11 – 1,14
168 – 252	1,14 – 1,16
252 – 340	1,17 – 1,18
336 – 755	1,18 – 1,19
755 – 910	1,19 – 1,21
910 – 1425	1,19 – 1,19
1425 – 1726	1,19 – 1,20

SCALA MISURE V / N

CAMPIONI DI CORE
Nessuno

MANIFESTAZIONI:

GAS
Da a 1121 trovato, non analizzato, di C1 nell'impianto gas.
Da a 1265 trovato e presente di gas nella sonoscintillazione e nella sonda.
A 1 bar di pressione sono stati misurati valori di 1,19 g/cm³ (m/l) a a 1265 la sovrapressione di un bar.

ACQUA
Da a 1982 incontrata nella sabbia acqua salata:
a 1 m = 1,19 g/l (m/l) di Cl
a 1,19 g/l (m/l) sino ad un max di 2,21 g/l (m/l) a a 1265 la sovrapressione di un bar.

PROVE DI STRATO IN FORO SCOPERTO
Nessuna

PROVE DI STRATO IN COLONNA
Nessuna

PROVE DI IDROCARBURI

a 130	17/07
a 167	17/07
a 196	17/07
a 226	17/07
a 1121	17/07
a 1265	17/07
a 1472	17/07
a 1726	17/07

CAMPIONI CONCENTRATI
DI CEMENTO

da a 0 a 130 m argilla grigia, plastica, a volte siltosa e sabbiosa, intercalazioni di (limoli e marne) di sabbia più frequenti verso il basso, più o meno argillosa, grossolana, fine ed elementi da subangolari a subarrotondati di 1 a 5 mm, raramente di 6 a 9 mm, quarzosa, calcarea, micacea, glauconitica, rari frammenti calcarenitici e resti di Lamellibranchi.

da a 130 a a 196 m argilla grigia, plastica, leggermente marnosa e siltosa, intercalazioni di (limoli e marne) di sabbia più frequenti verso il basso, più o meno argillosa, grossolana, fine ed elementi da subangolari a subarrotondati di 1 a 5 mm, raramente di 6 a 9 mm, quarzosa, calcarea, micacea, glauconitica, rari frammenti calcarenitici e resti di Lamellibranchi.
Tracce di pirite e lignite.
Poco fossilifera.

da a 196 a a 980 m argilla grigio scura, debolmente siltosa a sabbiosa, grossolana, fine ed elementi da subangolari a subarrotondati di 1 a 5 mm, raramente di 6 a 9 mm, quarzosa, calcarea, micacea, glauconitica, rari frammenti calcarenitici e resti di Lamellibranchi (ostracodi e frammenti indeterminati di Pelecipodi e Gasteropodi) sottordinati di argilla marnosa grigio chiara (frammenti fossilici sottordinati di argilla marnosa grigio chiara (frammenti fossilici sottordinati di argilla marnosa grigio chiara (frammenti fossilici