AGIP

CONCESSIONE di

MONTE CIGLIANO

POZZO n°

DIREZIONE MINERARIA
SETTORE CENTRO MERIDIONALE

PROFILO SCALA 1:1000

Livello mare da Tavola Rotary m 0,00 s.l.m.
Livello terreno da Tavola Rotary m 4,00 s.l.m.

Coordinate: Lat. 41°47'24" - Long. 13°07'37"
Fuso: Monte Mario

Pratiche approvate da UNIONE MINIERE

UFFICIO MINERARIO
Ultima perforazione
Ultimo mandato

PROVINCIA di RIETI

Profondità totale 2497,00 m

DIAGRAMMA SCHLUMBERGER
Profondità misurata dal Piano Rotary

DESCRIZIONE LITOSTRATIGRAFICA

OSSERVAZIONI

Fanghi di circolazione a densità variabile da 1,10 a 1,20 kg/l. Viscosità da 40 a 60 sec. Filtrato da 7 a 10 cc.

Tra il Pleistocene e la piattaforma carbonatica laziale-abruzzese si rinviene una potente successione terrigena costituita da argille, sabbie, conglomerati poligenici e brecce calcaree. Questa successione è stata attribuita alla Formazione Argillosa Scagliosa (Miocene superiore - Pliocene inferiore).

Alla base della Formazione Argillosa Scagliosa si rinviene una successione costituita da calcari marnosi e marne calcaree, attribuita alla Formazione Calcareo-Marnosa (Miocene inferiore - Miocene medio).

Al di sotto della Formazione Calcareo-Marnosa si rinviene una successione costituita da calcari, calcari dolomitici e dolomie, attribuita alla Piattaforma Carbonatica Laziale-Abruzzese (Cretacico superiore - Miocene inferiore).

Alla base della successione carbonatica si rinviene una successione costituita da calcari, calcari dolomitici e dolomie, attribuita alla Piattaforma Carbonatica Laziale-Abruzzese (Cretacico inferiore - Cretacico superiore).

Al di sotto della successione carbonatica si rinviene una successione costituita da calcari, calcari dolomitici e dolomie, attribuita alla Piattaforma Carbonatica Laziale-Abruzzese (Giurassico - Cretacico inferiore).

Alla base