LEGENDA

Alluvioni ghiaioso-sabbioso-argillose dell'alveo dei fiumi attuali e depositi sabbiosi litorali
(OLOCENE)

Argille marnoso-siltose grigio azzurre (A), talora lievemente sabbiose, con intercalazioni di sabbie e arenarie variamente cementate (S) e, verso la base, sabbie grossolane passanti a conglomerati poligenici (C).
(PLIOCENE MEDIO)

Argille marnose grigio-azzurre (A), siltoso-sabbiose, eteropiche con sabbie ed arenarie debolmente cementate (S).
(PLIOCENE INFERIORE)

Formazione a "Colombacci": argille e marne argillose con intercalazioni arenacee (Ag), passanti lateralmente ad arenarie (Ar) debolmente cementate con frequenti intercalazioni argillose. Verso l'alto si intercalano cinque orizzonti marker di calcare chimico (Colombacci).
(MESSINIANO - PLIOCENE INFERIORE P.P.)

Formazione "Gessoso-solfifera": marne talora bituminose variamente associate a calcari carlati di origine chimica e gessi.
(MESSINIANO MEDIO)

"Ghioli di Letto": marne argillose bianco-grigiastre, talora ocracee, spesso bituminose, con intercalazioni di livelli e strati sabbiosi.
(MESSINIANO INFERIORE)

Formazione "Schlier": alternanze di marne, marne calcaree e calcari marnosi biancastri; rare intercalazioni di argille montmorillonitiche.
(TORTONIANO - SERRAVALLIANO P.P.)

Limite del permesso

Limite stratigrafico

Faglia

Faglia inversa

A — B Traccia sezione geologica TAV.1



11226

SNIA BPD DIVISIONE MINERARIA MILANO				SCALA 1: 25 000
	ALL.to N° 1	DATA NOV-88	N. ARCH.	

PERMESSO

FANO

RILIEVO GEOLOGICO DI SUPERFICIE