d385 B.R - AG

Profilo del pozzo: AG472

Agip S.p.A.
GESO–SNOR

MARCA DA BOLLO L.100 — MARCA DA BOLLO LIRE 200 — 15 APR. 1982

B. R9. AS/2 (GLORIA 1) OFF-SHORE

Permesso: (Joint venture: AGIP-SHELL)

Disegno N°	Aggiornato al	Allegato a: RELAZIONE FINALE "GLORIA 1"	Allegato N° 6
Scala: 1:1000	Data: OTTOBRE '80	Compilatore: V. COSTA	Disegnatore: P. LOMBARDI

ITALIA – Mare Adriatico (Zona B)

Carta — F° — Tav — Scala 1:25.000



Coord. geog. Long 14°06'44",361 E — Lat 43°21'06",267 N
Coord. piane E m 2448057,471 — N m 4800345,730
Fondo pozzo Long 14°06'39",987 E — Lat 43°21'01",85 N

ROCCE TERRIGENE
- Elementi di breccia
- Ciottoli
- Sabbia grossolana
- Sabbia fine
- Sabbia quarzosa
- Sabbia sublitica
- Sabbia litica
- Sabbia subfeldspatica
- Sabbia feldspatica
- Silt
- Argilla
- Marna

CEMENTI
- Cemento in generale
- Cemento siliceo
- Cemento carbonatico
- Cemento calcitico
- Cemento dolomitico
- Cemento solfatico
- Cemento ferruginoso
- Cemento sideritico

ROCCE CARBONATICHE
- Calcare in generale
- Mudstone
- Wackestone
- Packstone
- Grainstone
- Boundstone
- Chalk
- Calcare dolomitico
- Dolomia calcarea
- Dolomia in generale
- Dolomia media e grossa (> 62 μ)
- Dolomia fine (< 62 μ)

ALTRE ROCCE
- Gesso o anidrite
- Sali di Na, K, Mg.
- Carbone in generale
- Selce
- Rocce ferruginose

ROCCE IGNEE E METAMORFICHE
- Rocce intrusive
- Rocce effusive
- Rocce filoniane
- Rocce piroclastiche
- Rocce metamorfiche

PARTICELLE E FOSSILI
- Intraclasti angolosi in generale
- Intraclasti arrotondati in generale
- Pellettoidi
- Ooliti
- Oncoliti
- Macrofossili in generale
- Alghe
- Briozoi
- Coralli
- Crinoidi
- Lamellibranchi
- Rudiste
- Macroforaminiferi
- Microfossili in generale
- Foraminiferi planctonici
- Foraminiferi bentonici
- Frammenti di fossili
- Rudiste in frammenti
- Radiolari
- Spicole di Spugna
- Ostracodi

STRUTTURE SEDIMENTARIE E DIAGENETICHE
- Stratificazione massiccia
- Stratificazione decimetrica
- Laminazioni parallele
- Stratificazione incrociata
- Stratificazione gradata
- Strutture nodulari
- Stromatoliti
- Bioturbazioni
- Stratificazione disturbata
- Laminazioni convolute
- Ripple marks
- Fessure di essiccazione
- Pressure solution
- Strutture geopete
- Birdseyes

TIPI DI POROSITA'
- PK Porosità chalk
- PI Porosità intergranulare
- PV Porosità vacuolare
- PC Porosità intercristallina
- PF Porosità per fratture

SIMBOLI VARI
- Assorbimenti
- Perdite di circolazione
- Carote di fondo con parte ricuperata
- Carote di parete
- F.I.T. – R.F.T.
- Contatto tettonico
- Discontinuità in generale
- Fratture
- Azimut e inclinazione

MINERALIZZAZIONE
- Acqua dolce
- Acqua salmastra
- Acqua salata
- Tracce di gas
- Gas
- Anidride carbonica
- Tracce di olio
- Olio

MANIFESTAZIONI DURANTE LA PERFORAZIONE
- Tracce di gas
- Gas
- Acido solfidrico
- Anidride carbonica
- Tracce di olio
- Olio
- Bitume
- Acqua salata
- Acqua dolce
- Gas ed acqua salata
- Tracce di gas e di olio

- Tubi cementati
- Tubi forati con fucile
- Tubi presi
- Aste di perforazione prese
- Tappi di cemento
- Squeezing
- Bridge plug
- Foro direzionato
- Foro deviato
- Prova di strato riuscita
- Prova di strato non riuscita
- Prova di produzione
- Tubing con packer di produzione
- Pompa

Impianto IDECO P.2500 .. SCARABEO II — Inizio perforazione 11 - 12 - 1979 — Intervallo in produzione — — Esito del pozzo STERILE
Contrattista SAIPEM — Fine perforazione 17 - 2 - 1980 — Inizio produzione — — Status ABBANDONATO
Profondità totale m 2380 — Impianto rilasciato il 13 - 3 - 1980

Quota s.l.m.: Tavola rotary m 33,00 — Prima flangia m — — Piano campagna m — — Fondo mare m 67,00 — TR-PC m —

CUTTINGS	ETA'	FORMAZIONE	PROFONDITA' IN METRI	COLONNA LITOLOGICA	AZIMUT INCLINAZIONE	POTENZIALE SPONTANEO (mV) O GAMMA RAY (API Units)	Mineralizz. Manifestaz.	RESISTIVITA' ohms m²/m	CAROTE	AMBIENTE	Strutture e tipi di porosità	PALEONTOLOGIA: FOSSILI	ZONE	PROVE ESEGUITE	TUBAZIONI 30" 20" 13" 3/8 9" 5/8	OSSERVAZIONI	Avanzamento

CAROTE DI FONDO (descrizione)

1a m 1163 - 1154 - Recupero: 94%. Mudstone/Wackestone grigio-biancastro, fossilifero compatto. Pendenze: 15-20°. Manifestazioni: nessuna. Età: Eocene medio. Formazione: Scaglia

2a m 1353 - 1344 - Recupero: 100%. Mudstone/Wackestone, fossiliferi con stiloliti suborizzontali e a 45° con qualche intercalazione di packstone intraclastico, fossilifero. Pendenze: 20 ÷ 25° prob. Manifestazioni: nessuna. Età: Campaniano. Formazione: Scaglia

3a m 1828,50-1822- Recupero: 88%. Mudstone biancastro compatto, fossilifero con frequenti stiloliti e qualche nodulo di selce grigia. Pendenze: N.R. Manifestazioni: odore di H2S alla frattura. Età: Aptiano-Barremiano. Formazione: Maiolica.

4a m 2306-2303,50- Recupero: 80%. Mudstone/Wackestone grigio verdastro compatto, fossilifero con stiloliti subverticali e fratture a 45° completamente cementate. Pendenze: 45-50° prob. Manifestazioni: nessuna. Età: Lias medio. Formazione: Corniola.

5a m 2338 - 2335 - Recupero: 35%. Packstone/Grainstone nocciola, intraclastico e fossilifero, talora ricristallizzato. Pendenze: N.R. Manifestazioni: Fluorescenza indiretta giallo-azzurra. Età: Lias inferiore. Formazione: Massiccio.

6a m 2344 - 2338 - Recupero: 33%. Packstone nocciola, intraclastico, fossilifero con rare fratture orizzontali e subverticali parzialmente cementate. Pendenze: N.R. Manifestazioni: fluorescenza gialla e tracce di bitume. Età: Lias inferiore. Formazione: Massiccio.

Analisi Ionica
Campione di acqua prelevato durante il DST n°3 m 1429-1451 dopo 41,... mc di fluido erogato.
Salinità come NaCl = 103,...
Fluorescenza = azzurra intensa di ...
Campione inquinato da prodotti di acidificazione.